

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ウチダの漢方便秘薬

ウチダの大甘丸

ダイカンガン

ウチダの大甘丸は漢方処方にしたがって、生薬粉末を配合して丸剤としたものです。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
- * 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - * (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - * (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

- 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- * (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	げげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- * (2) 5~6日間服用しても症状がよくならない場合

- * 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

効能・効果

便秘

用法・用量

次の1回量を1日2回食前又は食間、あるいは就寝前に服用する。

年齢	1回量
大人(15歳以上)	10~20丸
15歳未満7歳以上	7~13丸
7歳未満4歳以上	5~10丸
4歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

- * (2) 幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

成分・分量

本品3g(40丸 1日分)中
ダイオウ末 10g } 以上の割合で 2.941g
カンゾウ末 5g } 混合した粉末
丸薬の結合剤としてカルメロースNaを含有する。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8