

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ウチダの漢方製剤

ウチダの 八味丸

ハチミガン

ウチダの八味丸は漢方処方にしたがって、生薬を配合し粉末化して丸剤としたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	のぼせ、どうき

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

* 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下痢

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

効能・効果

疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少または多尿で時に口渇がある次の諸症: 下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用する

年齢	1回量
成人(15歳以上)	2g(20丸)
15歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品6.154g(60丸1日分)中

ジオウ	8g	} 以上の割合で 混合し粉末化 したもので	5.031g
サンシュユ	4g		
サンヤク	4g		
タクシャ	3g		
ブクリョウ	3g		
ボタンピ	3g		
ケイヒ	1g		

加工ブシ末 0.097g

丸薬の結合剤としてハチミツを含有する。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8